



21/10/2021

הנדון : החלפת תכשירי לוסרטן (Losartan) בתכשירי קנדסרטן (Candesartan)

תכשירים המכילים קנדסרטן הינם בטוחים בשימוש, יעילים לעיתים אף יותר מלוסרטן בהורדת לחץ הדם, ופעילותם טובה יותר לאורך שעות היממה, ולפיכך ניתן לקחתם פעם אחת ביום, בבוקר או בערב.

מומלץ כי ההחלפה בין תכשירי לוסרטן לקנדסרטן תתבצע באופן הנ"ל :

- לוסרטן במינון 50 מ"ג יוחלף בקנדסרטן במינון 8 מ"ג פעם ביום.
- לוסרטן במינון 12.5 מ"ג או 25 מ"ג יוחלפו בקנדסרטן במינון 4 מ"ג (ניתן לחצות כדור של 8 מ"ג).
- תכשירים המכילים לוסרטן בשילוב הידרוכלורתיאזיד (50/12.5) יוחלפו בתכשירים המכילים קנדסרטן בשילוב הידרוכלורתיאזיד (16/12.5). רק במידה ונצפית ירידת לחץ דם מעבר לרצוי, יש ליטול בנפרד קנדסרטן 8 מ"ג וחצי כדור דיזותיאזיד 25 (כלומר 12.5 מ"ג).

מטופל הנוטל בבוקר לוסרטן בשילוב הידרוכלורתיאזיד (50/12.5) ובערב לוסרטן 50 מ"ג רגיל, ייטול בבוקר קנדסרטן 16/12.5 מ"ג (או בנפרד קנדסרטן 16 מ"ג וגם חצי כדור דיזותיאזיד 25, כלומר 12.5 מ"ג) ובשלב הראשון לא יזדקק לתחליף בערב.

יש לבצע את השינוי ולעקוב אחר לחץ הדם. במרבית המטופלים יעד לחץ הדם הינו פחות מ- 130 מ"מ"כ סיסטולי ופחות מ- 80 מ"מ"כ דיאסטולי בממוצע מדידות ביתיות.

כמו כן ניתן במקרים המתאימים להשתמש בתרופות ממשפחת מעכבי האנזים המהפך (ACE INHIBITORS) כחלופה טיפולית נוספת לתכשירי לוסרטן.

ניתן לפנות בשאלות לפרופ' עדי לייבה יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם
בכתובת הדוא"ל - adilei@assuta.co.il

פרופ. עדי לייבה

יו"ר, החברה הישראלית ליתר לחץ דם

| חלופה ב' (אם לחץ הדם גבוה או נמוך מהרצוי) | חלופה א' (מ"ג) | מינון ביממה (מ"ג) | תרופה |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | CANDESARTAN 4/day | 12.5 | LOSARTAN |
| | CANDESARTAN 4/day | 25 | LOSARTAN |
| | CANDESARTAN 8/day | 50 | LOSARTAN |
| CANDESARTAN 32/day | CANDESARTAN 16/day | 100 | LOSARTAN |
| CANDESARTAN 8 + HCTZ 12.5 | CANDESARTAN 16/HCTZ 12.5 | 50/12.5 | LOSARTAN+HCTZ |
| | CANDESARTAN 16/HCTZ 12.5 | 100/12.5 | LOSARTAN+HCTZ |
| CANDESARTAN 16 + HCTZ 25 | CANDESARTAN 16/HCTZ 12.5 x2/day | 100/25 | LOSARTAN+HCTZ |

--